

ഓട്ടിസത്തെ ഭയക്കുകയല്ല, കരുതലോടെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. ആരംഭത്തിലേ ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടും

നെർവ്വമേക്കൾ

നിന്നി മേരി ബേബി

പിറക്കാൻ പോകുന്നവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഒരു വീട് നെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിരതോട്ടിലിലേക്കാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിച്ചുവീഴുന്നത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞുമനസ്സിലെ ശരീരത്തെയും കൂടുതലാഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥിരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു തുളിക്കപ്പെടുന്ന ഓട്ടിസം എന്ന വിലുന് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കി

നു കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അതികമിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരറ്റാതെ, കണ്ണൂരുന്നങ്ങാതെ കുഞ്ഞിനു കാവലിക്കുന്നവർ ഏറെ. ആദ്യമേ കണ്ടെത്തിയാൽ, ആരംഭത്തിലേ ചികിത്സിച്ചാൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായൊരു ജീവിതം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഓട്ടിസത്തെ, ഒട്ടേറെ കഴിവുകളുള്ള ഒരവസ്ഥയായും കൂടുതലായും തിരിച്ചറിയും. ആ കഴിവുകളെ വളർത്തി അവരെ മിടുക്കരാക്കുകയും ചെയ്യും.

ലക്ഷണങ്ങൾ:

- രണ്ടു വയസ്സിനു ശേഷവും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാതിരിക്കുക.
- ഉച്ചാരണപ്പദവുകൾ, വാക്കുകൾ ചേർത്തു പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.
- ശബ്ദത്തോടും മറ്റും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക, മുഖത്തു നോക്കാതിരിക്കുക.
- പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ, അസാധാരണ ചേഷ്ടകൾ.
- എന്തിനേക്കെങ്കിലും ഏറെനേരം നോക്കിയിരിക്കുക.

ഇവയൊക്കെ ഓട്ടിസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു. മറ്റും പറഞ്ഞ് ഇവ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. കുഞ്ഞ് നന്നായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷം ആറോ ഏഴോ മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് സംസാരത്തിന്റെ താളം തെറ്റിയാലും സൂക്ഷിക്കണം.

സ്പീച്ച് തെറപ്പി മാത്രമല്ല

ഓട്ടിസത്തിനു ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കുറവാണ്. സംസാരിക്കാൻ പെറുകയാൽ നന്നെ പോയി സ്പീച്ച് തെറപ്പി തുടങ്ങുകയോ കുഞ്ഞിനെ സ്വപക്ഷത്ത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുകയോ ആണു മിക്കവാറും ചെയ്യുക. സംസാരിക്കാൻ പെറുകുന്നതു മിക്കവാറും ഓട്ടിസത്തിന്റെ പ്രാരംഭലക്ഷണം. മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കുക. ബാധിത ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കണം.

ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മുഖമുളളതല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ ചികിത്സ തുടങ്ങുക. ചികിത്സയെന്നാൽ, പെരുമാറ്റാപീകരണത്തിനും സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങളാണ്. വീഡിയോ തെറപ്പികളിലൂടെ ഇതു സാധ്യമാണ്. ഓപ്പൺഡിസ്കസ് ഓട്ടിസം നേരിട്ട് സ്കൂളിൽ(സ്വീഡിഷ്) വഴി ഓട്ടിസത്തിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുകയാണ്

ഒട്ടും വൈകരുത് ചികിത്സ

രണ്ട് - അഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രതിവിധി തേടിത്തുടങ്ങിയാൽ ഓട്ടിസത്തെ പൂർണ്ണമായിത്തന്നെ മറികടക്കാം. ചികിത്സ വൈകുന്നതോടു സുഖപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. പത്തുവയസ്സിനു മുൻപേ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുഖപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അതിവീടുമാണ്. ഏറെപ്പേർക്കും മാന്സികവൈകല്യമുണ്ടാകുന്നു. ഒരു കാര്യവും സന്ധ്യ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അപസ്ഥിരം. പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, എന്തായാണെന്നു ധർമ്മിക്കാൻ പെടാമെന്നുള്ള സിദ്ധി നേടാം.

രോഗമല്ല, മരുന്നില്ല

ഓർക്കുക: ഓട്ടിസം രോഗമല്ല, അസാധാരണമാണ്. ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ മനസ്സിലാക്കാനോ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമൊക്കെ ഏകീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ കഴിയാത്ത വരുന്ന, തലച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേക അവസ്ഥ. രോഗമല്ല എന്നതിനാൽ തന്നെ ഓട്ടിസത്തിനു മരുന്നില്ല. അക്രമവാദന, അസാധാരണ തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമേ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ.



ആരോഗ്യം

കഴിവുണർത്തും തെറപ്പികൾ

സംവേദന ക്ഷമതയും ഏകാഗ്രതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രേഷൻ തെറപ്പി, പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി, സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ്. ഉറങ്ങാലോടുക, പറ്റുപറ്റുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുടെ നടക്കുക, നേർമുഖമായിട്ടുള്ള നടക്കുക, ഒരേതരത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു ചാടുക, പലനിറങ്ങളിലുള്ള പന്തുകൾ യഥാസ്ഥാനത്തു വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ വീഡിയോ തെറപ്പികളുടെ ഭാഗമാണ്.

മനസ്സിലാക്കി, ഈ തെറപ്പികളിൽ വേണ്ടതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ നൽകിയാലേ യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കൂ. ഒട്ടും സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടി ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയുന്നതുവരെ ചികിത്സയുടെ നാൾവഴികളിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർണ്ണവാചകത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യം പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുവരുന്നു. മുന്നൂറുവയസ്സിനു മുൻപേ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ ആവശ്യമായ പത്തുമാസത്തിനകം പ്രകടനമായ മാറ്റമുണ്ടാകും. അഞ്ച് - എട്ടു വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങാൻ ഒന്നര വർഷത്തോളമെടുക്കും. പത്തുവയസ്സിനു ശേഷം ഈ തെറപ്പികളും ഫലം ചെയ്തെന്നുവരില്ല.

കൂടെ വേണം കുടുംബം

കുട്ടിയും രക്ഷിതാവും പരിശീലകനും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സമഗ്രമായ ചികിത്സാരീതി. ചികിത്സാ സമയത്തുടനീളം കുടുംബത്തിൽനിന്നു വഴി രക്ഷിതാവിന് അസുഖത്തിന്റെ സമഗ്രവിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ചികിത്സയെക്കുറിച്ചു കൂടുതലായ അവബോധം ലഭിക്കുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയാലും കുട്ടിക്കു വേണ്ട പരിശീലനം നൽകാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. വളരെ വ്യക്തതയോടെയും ലളിതമായും സംസാരിക്കുക, കുട്ടിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെ ക്ഷമയോടെ ആവർത്തിക്കുക, പ്രതികരിക്കാൻ സമയം നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഭക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാം

എണ്ണയിൽ വറുത്തവ, ബിസ്കറ്റുകൾ, പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും, മധുരമുള്ളവ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇവ ഒഴിവാക്കണം.

ആറാടും സംഖ്യ ഗുണിക്കാൻ ഒറ്റ സെക്കൻഡ്!

സ്വപക്ഷത്ത് സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കൂടുതലായ ചികിത്സ നേടിയാൽ അതു തുടരുന്നതിനൊപ്പം സാധാരണ സ്കൂളിൽ തന്നെ പോകാം. സ്കൂളിലെ ക്ലബ്ബ് രൂപമുള്ള ആശയവിനിമയം ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ കൂടുതലായി വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. നാലുവയസ്സിനു മുൻപ് ഓട്ടിസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠനം തുടരുന്നതിന്റെ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം.

ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ വളർത്താനുള്ള പരിശീലനം നൽകുമ്പോൾ അവർ മിടുക്കരാകുന്നു. ആറാടും സംഖ്യകൾ നെക്കർഡുകൾക്കും ഗുണിച്ചെടുത്ത ഉത്തരം പറയുന്ന കോട്ടയത്തെ ആറു വയസ്സുകാരി ഉദാഹരണം.

വീഡിയോ, ഡോ. ജെയിംസ് സാമുവൽ, ഡയറക്ടർ, ജൂവൽ ഓട്ടിസം സെന്റർ, കോട്ടയം.